■オピオイド等鎮痛力価換算表■

院内採用規格
◎患者限定　▲院外

タペンタ®錠 100mg/日
25mg◎▲ 100mg◎▲

X1/5 ↓ ↑ x5

オキファスト®注 15mg/日
10mg/1mL 50mg/5mL

x4/3 →
← x3/4

オキシコンチン®TR錠 20mg/日
5mg 20mg 40mg

x3/2 ↓ ↑ x2/3

塩酸モルヒネ注 15mg/日
10mg/1mL 50mg/5mL

x2 →
← x1/2

経口モルヒネ 30mg/日
10mg

x2/3 →
← x3/2

アンペック®坐剤 20mg/日
10mg

x1/5 ↓ ↑ x5

ナルサス®錠 6mg/日
2mg 6mg
12mg▲ 24mg◎▲

x1/4 ↓ ↑ x4

ナルベイン®注 1.5mg/日
2mg/1mL

フェントス®テープ 1 mg/日
0.5mg 1mg 2mg 4mg 6mg▲ 8mg▲

デュロテップ®MT 2.1mg/3日
2.1mg▲ 4.2mg▲ 8.4mg▲ 16.8mg▲

フェンタニル®注 0.3mg/日
0.1mg/2mL 0.5mg/10mL

弱オピオイド

コデインリン酸塩 内服 180mg/日

トラマドール 内服 150mg/日

※トアラセット配合錠
トラマドール37.5mg＋
アセトアミノフェン325mg

「MINTポータルサイト緩和ケアマニュアル」も参考にしてください。
困ったときは
緩和ケアチーム（PHS：7206）へご相談ください。