

## ■オピオイドスイッチングのタイミング■

前（先行） オピオイド製剤	変更後（新規） オピオイド製剤	タイミング
1日2回の オピオイド徐放製剤	フェンタニル貼付剤	前オピオイドの <b>最終投与と同時に</b> 貼付
	オピオイド持続注入	先行薬の投与時刻に新規オピオイドを開始 （または半分の流速で開始、6～12時間後に換算量とする）
1日1回の オピオイド徐放製剤	フェンタニル貼付剤	最終の前オピオイド投与12時間後に貼付
	オピオイド持続注入	先行薬の投与時刻に新規オピオイド開始
オピオイド持続注入	オピオイド徐放製剤	先行薬中止と同時に新規オピオイド開始
	オピオイド持続注入	
	フェンタニル貼付剤	貼付後、 <b>6～12時間後まで持続静注を併用</b>
フェンタニル貼付剤	オピオイド徐放製剤	先行オピオイド <b>剥離後6～12時間後</b> に新規オピオイド開始
	オピオイド持続注入	先行オピオイド <b>剥離後6～12時間後</b> に新規オピオイド開始 （または6時間後に半分の流速で開始し12時間後に換算量とする）

日本緩和医療薬学会編 緩和医療薬学 参照

## ■フェンタニル貼付剤とのスイッチングの実際■

