■オピオイド等鎮痛力価換算表■

□ 当院採用規格
◎患者限定　▲院外

タペンタ®錠 100mg/日
25mg◎▲
100mg◎▲

X1/5 ↓　↑ x5

オキファスト®注 15mg/日
10mg/1mL
50mg/5mL

x4/3 →
← x3/4

オキシコンチン®TR錠 20mg/日
5mg
20mg
40mg

x3/2 ↓　↑ x2/3

塩酸モルヒネ注 15mg/日
10mg/1mL
50mg/5mL

x2 →
← x1/2

経口モルヒネ 30mg/日
10mg

x2/3 →
← x3/2

アンペック®坐剤 20mg/日
10mg

X1/5 ↓　↑ x5

ナルサス®錠 6mg/日
2mg　6mg◎
12mg▲ 24mg▲

X1/5 ↓　↑ x5 ※経口に戻すときは x2.5が適切という説あり

ナルベイン®注 1.2mg/日
2mg/1mL

フェントス®テープ 1 mg/日
0.5mg　1mg
2mg　4mg
6mg ▲ 8mg ▲

デュロテップ®MT 2.1mg/3日
2.1mg　4.2mg
8.4mg ▲ 16.8mg ▲

フェンタニル®注 0.3mg/日
0.1mg/2mL
0.5mg/10mL

弱オピオイド

リン酸コデイン内服 180mg/日

トラマール内服 150mg/日

※トアラセット配合錠
トラマドール37.5mg＋
アセトアミノフェン325mg

「MINTポータルサイト緩和ケアマニュアル」も参考にしてください。
困ったときは
緩和ケアチーム（PHS7206）へ
ご相談ください。