

緩和ケア通信

2023年7月14日 緩和ケアセンター発行 Vol.7

緩和ケアセンターHP
QRコード

『オピオイドの変更について』をご紹介します
(緩和ケアマニュアルp.56 ~ p.58)


NEW オピオイド変更のタイミング(早見表)

変更前 (先行) オピオイド製剤	変更後 (新規) オピオイド製剤	タイミング
1日2回の オピオイド徐放製剤	フェンタニル貼付剤	前オピオイドの 最終投与と同時に 貼付
	オピオイド持続注入	先行薬の投与時刻に新規オピオイドを開始 (または半分の流速で開始、6~12時間後に換算量とする)
1日1回の オピオイド徐放製剤	フェンタニル貼付剤	最終の前オピオイド投与12時間後に貼付
	オピオイド持続注入	先行薬の投与時刻に新規オピオイド開始
オピオイド持続注入	オピオイド徐放製剤	先行薬中止と同時に新規オピオイド開始
	オピオイド持続注入	
	フェンタニル貼付剤	貼付後、 6~12時間後まで持続静注を併用
フェンタニル貼付剤	オピオイド徐放製剤	先行オピオイド 剥離後6~12時間後 に新規オピオイド開始
	オピオイド持続注入	先行オピオイド 剥離後6~12時間後 に新規オピオイド開始 (または6時間後に半分の流速で開始し8~12時間後に換算量とする)

※変更前または変更後が**フェンタニル貼付剤の場合は要注意!**
詳しくは緩和ケアマニュアル p.57 を見てね



NEW 院内オピオイド等鎮痛力価換算表がリニューアルしました



◆変更箇所のまとめ◆

- ① ナルサス⇔ナルベインの換算を変更しました(×5→×4へ)
- ② 院内採用マークを最新情報へ更新しました
- ③ 弱オピオイドを一般名に統一しました

2023年6月に院内の緩和ケアマニュアルを改訂しました

MINTポータルサイトから常時閲覧可能です。オピオイドの適正使用をお願いいたします!!

第30回 三重大大学緩和ケアセミナー 開催します

詳細・事前申込みはこちらのQRコードから ⇒⇒⇒

日時: 2023年7月27日(木) 18:30~19:45【ハイブリット形式】

内容: 「心不全の緩和ケア Part II」 (の講義です)

ACPと症状緩和のための薬剤の使用方法についてPart I からさらに深めます

