

レジメンカフェ5月 事前問題

症例

年齢： 63 歳 性別： 女性 来局歴： 初回
アレルギー・副作用歴： とくになし 既往歴： 高血圧症、2型糖尿病
併用薬： ジャヌビア錠25mg

処方内容

Rp1. デカドロン錠0.5mg 1回8錠 1日1回 朝食後 2日分
Rp2. リリカOD錠75mg 1回1錠 1日1回 就寝前 21日分
Rp3. アバプロ錠100mg 1回1錠 1日1回 朝食後 21日分

お薬手帳に記載された治療内容シールより、以下の注射剤投与歴を確認

Rp1. アロキシ点滴静注バッグ0.75mg + ファモチジン注射液 20mL +デキサート注射液19.8mg
Rp2. パクリタキセル点滴静注液 270 mg + 生理食塩液 500mL
Rp3. カルボプラチン点滴静注液 420 mg + 5%大塚糖液 250mL
Rp4. アバスチン点滴静注用 840 mg + 生理食塩液 100mL

臨床検査値

項目	身長	体重	体表面積	TP	ALB	BUN	Crea	eGFR	UA	Na	K
検査日	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
結果	158cm	56kg	1.56m ²	6.1	3.2	15	1.32	41	5.9	134	4.5

項目	Ca	P	Mg	AST	ALT	γGTP	T-Bil	TC	LDL-C	GLU	CK
検査日	5/1			5/1	5/1	5/1	5/1	5/1		5/1	5/1
結果	8.6	計測なし	計測なし	15	13	59	0.5	168	計測なし	232	89

項目	WBC	好中球数	PLT	Hb	PT-INR	HbA1C
検査日	5/1	5/1	5/1	5/1		3/1
結果	5200	2620	320	11.1	計測なし	7.2

その他診療情報

52-3. TC+BEV

[適用期間 2018/5/1~2018/5/21]

課題1. TC+BEV療法について、用量・前投薬が適切か確認しましょう

- 注射剤の用法・用量は適切でしょうか？
- 治療計画（レジメン内容）は？

課題2. この患者さんの副作用管理において、どのような点を重点的に確認しますか？

- 主な副作用とその対策について
- 病院に連絡・受診すべき副作用の初期症状について
- 患者さんに指導すべき日常のケア等について

課題3. 患者さんに家庭血圧の測定を指導するとき、どのような点に注意するよう伝えますか？

課題4. 患者さんは最近、足のむくみが気になる、と訴えられています。

何を確認しますか？どのような場合に医師に相談しますか？