

# 9 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始件数

分子 分母のうち、「脳血管疾患等リハビリテーション料」が入院日から4日以内に算定された症例数

条件① 計測期間において、様式1の「医療資源を最も投入した傷病」のICD10記載欄に、以下のICD10コードが記載されている退院症例数

ICD-10	病名
I63\$	脳梗塞

条件③ 以下のいずれかに該当する場合は除外する。  
 (1)様式1の入院年月日と退院年月日より在院日数を求め、3日以内の症例  
 (2)様式1の「退院時転帰」が以下のいずれかに該当する症例

値:6	最も医療資源を投入した傷病による死亡
値:7	最も医療資源を投入した傷病以外による死亡


分母

条件①の症例のうち、以下の条件をすべて満たす症例

- 条件② (1)様式1の「脳卒中の発症時期」が「発症3日以内」に該当する症例  
 (2)当該入院期間中に「脳血管疾患等リハビリテーション料」の算定があった症例

年月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	年間
分子	1	2	3	2	1	2	0	1	0	1	2	2	17
分母	1	4	5	2	1	3	0	2	0	1	2	2	23
実施率(%)	100.0	50.0	60.0	100.0	100.0	66.7	0.0	50.0	0.0	100.0	100.0	100.0	73.9

### 4日以内実施率



#### <解説>

脳梗塞は、脳の血管が細くなったり、血管に血栓が詰まることで、脳に酸素や栄養が送られなくなり、その部位の脳組織が壊死あるいは壊死に近い状態に陥ってしまう病気です。脳梗塞により、運動障害、言語障害、感覚障害等の後遺症が残ることがあります。脳梗塞の後遺症によって、寝たきりになることで、筋委縮・筋力低下、関節拘縮、肺炎、褥瘡、抑うつ等の廃用症候群が起こります。廃用症候群の発生を防止するためには、早期からのリハビリテーションが重要になります。そして、日常生活の自立と早期の社会復帰に繋げていくことが求められます。施設の体制によっては、理学療法士または作業療法士による本格的なリハビリテーション開始日が休日に該当した場合、リハビリテーションの開始が1日遅れる場合があります。