

1

Ⅱ度以上の褥瘡の新規発生件数

分子 発生件数


分母 計測期間における、延入院患者数

※分母設定は「高齢者(75歳以上)の退院患者数」としている病院もあります。(国立病院機構臨床評価指標)

年月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	年間
分子	2	4	5	2	2	4	8	1	3	4	5	2	42
分母	17,852	18,025	18,509	18,830	18,028	17,394	18,113	18,137	18,161	17,077	16,980	18,597	215,703
発生率(%)	0.11	0.22	0.27	0.11	0.11	0.23	0.44	0.06	0.17	0.23	0.29	0.11	0.19

・計算式 パーミル(‰)

・入院患者1000人あたり何人 Ⅱ度以上の新規褥瘡が発生しているかを表している 分子/分母×1000

**<解説>**

褥瘡の発生は、患者さんの生活の質(QOL)を低下させる要因となり、また褥瘡部位から感染症を発生した場合、他の疾患に対する治療に影響を与えるだけでなく、敗血症から死に至ることもあります。患者さんの状態によっては褥瘡の発生予防が困難な場合がありますが、褥瘡対策に関する診療計画に基づいて、適切な褥瘡対策を行っていくことが求められます。