

## 1

## Ⅱ度以上の褥瘡の新規発生件数

分子 発生件数


分母 計測期間における、延入院患者数

※分母設定は「高齢者(75歳以上)の退院患者数」としている病院もあります。(国立病院機構臨床評価指標)

年月	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	年間
分子	5	2	6	6	3	1	4	3	6	2	3	3	44
分母	17,792	17,539	17,901	19,243	18,660	17,099	18,123	17,523	17,822	16,302	16,491	17,146	211,641
発生率(%)	0.28	0.11	0.34	0.31	0.16	0.06	0.22	0.17	0.34	0.12	0.18	0.17	0.21

・計算式 パーミル(‰)

・入院患者1000人あたり何人 Ⅱ度以上の新規褥瘡が発生しているかを表している 分子/分母×1000



## &lt;解説&gt;

褥瘡の発生は、患者さんの生活の質(QOL)を低下させる要因となり、また褥瘡部位から感染症を発生した場合、他の疾患に対する治療に影響を与えるだけでなく、敗血症から死に至ることもあります。患者さんの状態によっては褥瘡の発生予防が困難な場合もありますが、褥瘡対策に関する診療計画に基づいて、適切な褥瘡対策を行っていくことが求められます。